

CRITÈRES D'INCLUSION POUR LE PARCOURS COCON DANS LA REGION PACA

PARCOURS

COCON

Soins précoces et coordonnés du NOUVEAU-NÉ VULNÉRABLE

L'inclusion se fait en tenant compte des différentes vulnérabilités selon des critères d'inclusion définis pouvant avoir des conséquences sur le neurodéveloppement. Dès la période postnatale immédiate, le NNV est inclus si l'un des professionnels, médical ou paramédical intervenant dans la prise en charge, remarque un facteur de vulnérabilité.

Nombre d'enfants inclus									
Critères d'inclusion	< 28SA ou ≤ 1000g	< 32 SA ou ≤ 1500g	Anoxo-ischémie traitée par hypothermie	Cardiopathies complexes	Malformations ou infections congénitales graves	Pathologie neuro	32SA-34SA+6j avec FDR	Psychotropes/toxiques	Nombre d'enfants inclus/an
Nombre d'enfants inclus/an	200	500	70	100	100	70	120	50	1210

► Parmi les facteurs de hauts risques de TDN de l'HAS

- La **grande prématurité** (< 32 semaines d'aménorrhée [SA] ou ≤ 1500g).
- Une encéphalopathie supposée **hypoxo-ischémique** ayant une **indication d'hypothermie thérapeutique**.
- Un **accident vasculaire cérébral (AVC)** artériel périnatal (diagnostiqué entre la 20e semaine de vie foetale et le 28e jour de vie y compris chez le nouveau-né prématuré).
- Les **anomalies de la croissance cérébrale** : microcéphalie avec périmètre crânien < - 2 DS à la naissance vérifiée secondairement ou macrocéphalie > + 3 DS pour le terme (AE) (persistant après une seconde mesure).
- Les **infections congénitales** symptomatiques à cytomégalovirus et autres foetopathies infectieuses : toxoplasmose, Zika, rubéole...
- Les méningo-encéphalites bactériennes et virales herpétiques.
- Les **cardiopathies congénitales** complexes opérées dans la 1^{ère} année de vie
- Une **exposition prénatale à un toxique majeur** :
 - certains antiépileptiques (valproate de sodium)
 - exposition sévère à l'alcool et/ou avec signes de foetopathie.
- Une **chirurgie majeure**, prolongée et répétée (cardiaque, cérébrale, abdominale, thoracique)

Site Marseille : CH Edouard Toulouse – 118 Chemin de

Mimet – 13015 MARSEILLE

Mail : coconpaca@reseausperinatmed.fr

Tel : 09 67 33 42 72

Site Nice : l'Archet 3

151 Route Saint Antoine de Ginestière

06200 NICE

Tel : 04 92 03 59 50



CRITÈRES D'INCLUSION POUR LE PARCOURS COCON DANS LA REGION PACA

▶ Parmi les facteurs de risques modérés de TDN de l'HAS

- Une **prématurité modérée de 32 SA + 0 jour à 34 SA + 6 jours, avec facteurs de risques aggravants psycho socio-économiques (cf tableau ci-dessous)**
- Les **malformations cérébrales** ou cérébelleuses de pronostic indéterminé (agénésie ou dysgénésie isolée du corps calleux, ventriculomégalie > 15 mm, petit cervelet avec ou sans anomalie du vermis cérébelleux, malformations kystiques de la fosse postérieure).

▶ Facteurs de risques psycho-sociaux aggravants



Associés aux facteurs de risques de Troubles du neuro-développement, ces facteurs de vulnérabilités conduisent à inclure le Nouveau-né dans le programme.

Vulnérabilités socio-économique

- Sans domicile fixe, seuil de pauvreté, parent isolé, faible niveau scolaire parental, etc
- Mère de moins de 18 ans
- Hébergement en foyer ou absence de domicile
- Isolement familial/ famille monoparentale
- Migration-transplantation ou situation irrégulière
- Grossesse multiple
- Pauvreté et bas niveau socio-économique
- Enfant(s) aîné(s) placé(s) ou assistance éducative judiciaire
- Enfant actuel placé
- Situation de handicap parental ou dans la fratrie nécessitant un accompagnement
- Déni de grossesse

Vulnérabilités psycho-affective

- Violence conjugale/intrafamiliale, antécédents d'expériences négatives vécues par la mère
- Exposition de l'enfant à des maltraitances ou négligence grave, difficultés psychologiques ou psychiatriques
- Vulnérabilité familiale de la mère, du père ou des parents
- Difficultés psychologiques ou psychiatriques actuelles dans le milieu familial
- Violences actuelles conjugales/intrafamiliales
- Exposition de l'enfant à des maltraitances ou négligences sociales graves (carences affectives, éducatives, sociales) roubles induits par une substance
- Alcoolisme ou toxicomanie du père
- Événements entraînant la rupture des liens affectifs
- Dépression maternelle dans la période post-natale
- Discontinuité des processus de soins maternels dans la première année
- Perturbations psychologiques sévères et actuelles dans le réseau familial
- Trouble stress aigu et trouble stress post-traumatique parental
- Enfant, dont la mère a été hospitalisée pour décompensation psychiatrique pendant la grossesse ou les 6 premiers mois de vie de l'enfant
- Expériences négatives vécues par les parents durant leur enfance entraînant un attachement insécurité et/ou à des réponses neurobiologiques inadaptée

Site Marseille : CH Edouard Toulouse – 118 Chemin de

Mimet – 13015 MARSEILLE

Mail : coconpaca@reseuperinatmed.fr

Tel : 09 67 33 42 72

Site Nice : l'Archet 3

151 Route Saint Antoine de Ginestière

06200 NICE

Tel : 04 92 03 59 50

