

CRITÈRES D'INCLUSION POUR LE PARCOURS COCON DANS LA REGION PACA



L'inclusion se fait en tenant compte des différentes vulnérabilités selon des critères définis pouvant avoir des conséquences sur le neurodéveloppement. Dès la période postnatale immédiate, le NNV est inclus si l'un des professionnels, médical ou paramédical intervenant dans la prise en charge, remarque un facteur de vulnérabilité.

CRITERES D'INCLUSION PARCOURS COCON

< 33 et/ou ≤ 1500g	33 SA - 34 SA+6j avec FDR de vulnérabilités psycho-sociales	RCIU <3 ^e perc	Anoxo-ischémie traitée par hypothermie	Cardiopathies complexes	Malformations ou infections congénitales graves	Pathologies neurologiques graves	Psychotropes/toxiques
--------------------	---	---------------------------	--	-------------------------	---	----------------------------------	-----------------------

Sans critères d'AG

Facteurs de risques de TDN de l'HAS

- La **grande prématurité** (< 33 semaines d'aménorrhée [SA] ou ≤ 1500g).
- **La **prématurité modérée** de 33 SA + 0 jour à 34 SA + 6 jours, avec RCIU < 3ème per et/ou facteurs de risques aggravants psycho-sociaux (cf tableau ci-après)*
- L'encéphalopathie **hypoxo-ischémique** ayant une **indication d'hypothermie thérapeutique**.
- Les pathologies neurologiques graves comme l'**accident vasculaire cérébral (AVC)**, les **anomalies de la croissance cérébrale** (microcéphalie avec périmètre crânien < - 2 DS, macrocéphalie > +3DS) et ***les malformations cérébrales ou cérébelleuses de pronostic indéterminé**.
- Les **infections congénitales** symptomatiques (à **cytomégalovirus** et autres foetopathies infectieuses : toxoplasmose, Zika, rubéole...) et les méningo-encéphalites néonatales bactériennes ou virales (**herpès ++**)
- Les **malformations graves** nécessitant une **chirurgie dans la 1^{ère} année de vie** comme les **cardiopathies congénitales complexes**, les malformations digestives, thoraciques, la séquence de Pierre Robin ...
- L'**exposition prénatale à un toxique majeur** :
 - certains antiépileptiques (comme le valproate de sodium)
 - exposition sévère à l'alcool et/ou avec signes de foetopathie.
 - autre exposition (tabac, drogues, traitements médicamenteux...)

Site Marseille : CH Edouard Toulouse – 118 Chemin de

Mimet – 13015 MARSEILLE

Mail : coconpaca@reseausuperinatmed.fr

Tel : 09 67 33 42 72

Site Nice : l'Archet 3

151 Route Saint Antoine de Ginestière

06200 NICE

Tel : 04 92 03 59 50



CRITÈRES D'INCLUSION POUR LE PARCOURS COCON DANS LA REGION PACA

Facteurs de risques psycho-sociaux aggravants

Vulnérabilités socio-économique

- Sans domicile fixe, seuil de pauvreté, parent isolé, faible niveau scolaire parental, etc
- Mère de moins de 18 ans
- Hébergement en foyer ou absence de domicile
- Isolement familial/ famille monoparentale
- Migration-transplantation ou situation irrégulière
- Grossesse multiple
- Pauvreté et bas niveau socio-économique
- Enfant(s) aîné(s) placé(s) ou assistance éducative judiciaire
- Enfant actuel placé
- Situation de handicap parental ou dans la fratrie nécessitant un accompagnement
- Déni de grossesse

Vulnérabilités psycho-affective

- Violence conjugale/intrafamiliale, antécédents d'expériences négatives vécues par la mère
- Exposition de l'enfant à des maltraitements ou négligence grave, difficultés psychologiques ou psychiatriques
- Vulnérabilité familiale de la mère, du père ou des parents
- Difficultés psychologiques ou psychiatriques actuelles dans le milieu familial
- Violences actuelles conjugales/intrafamiliales
- Exposition de l'enfant à des maltraitements ou négligences sociales graves (carences affectives, éducatives, sociales) roubles induits par une substance
- Alcoolisme ou toxicomanie du père
- Événements entraînant la rupture des liens affectifs
- Dépression maternelle dans la période post-natale
- Discontinuité des processus de soins maternels dans la première année
- Perturbations psychologiques sévères et actuelles dans le réseau familial
- Trouble stress aigu et trouble stress post-traumatique parental
- Enfant, dont la mère a été hospitalisée pour décompensation psychiatrique pendant la grossesse ou les 6 premiers mois de vie de l'enfant
- Expériences négatives vécues par les parents durant leur enfance entraînant un attachement insécure et/ou à des réponses neurobiologiques inadaptée



* La prématurité modérée et les malformations cérébrales de pronostic indéterminé nécessitent d'être associées aux facteurs de vulnérabilités psycho-sociales (cf ci-dessus) ou un autre facteur de risque afin d'inclure le nouveau-né dans le parcours.